

Helicobacter Pylori Elptests

Helicobacter pylori elptests jāveic, lai pārliecinātos, vai baktērijas ir pilnībā izskaustas pēc ārstēšanas.

Testa rezultāti palīdz noteikt *Helicobacter pylori* klātbūtni un efektīvi diagnosticēt infekciju.

Lai nodrošinātu precīzus testa rezultātus, ir jāievēro sekojošie norādījumi:

- Diēta. 6-8 stundas pirms testa nedrīkst ēst un dzert (izņemot tīru ūdeni). Jāizvairās no kofeīna, piena, alkohola un skābiem ēdieniem. Nedrīkst košļāt gumiju vai lietot jebkāda veida konfektes
- Drīkst tīrīt zobus, bet nedrīkst norīt zobu pastu vai ūdeni
- Jāizvairās no smēķēšanas vismaz 6-8 stundas pirms testa
- Medikamentu ierobežojumi

Zemāk norādītos medikamentus NEDRĪKST lietot pirms testa.

Pirms jebkādu zāļu lietošanas pārtraukšanas obligāti konsultējieties ar ārstu.

4 nedēļas pirms testa - nedrīkst lietot jebkuras antibiotikas.

14 dienas pirms testa - nedrīkst lietot: bismutu, gastroprotektorus, protonu sūkņa inhibitorus (konkrēti: De-Nol, Sucralfate, Omeprazole, Escadra, Nolpaza, Losec, Nexium).

24 stundas pirms testa - nedrīkst lietot bāriju, nedrīkst veikt Rtg izmeklējumus ar bārija dzērienu.

8 stundas pirms testa un testa laikā - aizliegti antacīdi, H₂ receptoru antagonisti (konkrēti: Cimetidine, Ranitidine, Renni, Gastrotuss, Maalox).