

Дыхательный тест на хеликобактер пилори

Дыхательный тест на хеликобактер пилори проводится, чтобы убедиться, что бактерии полностью устранены после лечения.

Результаты теста помогают установить наличие хеликобактера пилори и эффективно диагностировать инфекцию.

Чтобы обеспечить точность результатов теста, необходимо соблюдать следующие указания:

- Диета. За 6-8 часов до теста не разрешается есть и пить (разрешается только чистая вода). Необходимо воздержаться от кофеина, молока, алкоголя и кислых продуктов. Не разрешается жевать резинку или применять любого рода конфеты
- Разрешается чистить зубы, но не разрешается проглатывать зубную пасту или воду
- Необходимо воздержаться от курения, по крайней мере, за 6-8 часов до теста
- Ограничения, связанные с приемом медикаментов

До теста ЗАПРЕЩАЕТСЯ применением следующих медикаментов.

Перед прекращением приема любых лекарств обязательно проконсультируйтесь с врачом.

За 4 недели до теста - запрещается применение любых антибиотиков.

За 14 дней до теста - запрещается применение висмута, гастропротекторов, ингибиторы протонной помпы (а именно: Де-Нол, Сукральфат, Омепразол, Эскадра, Нольпаза, Лосек, Нексиум).

За 24 часа до теста - запрещается применение бария, запрещается проведение рентгеновских исследований с раствором бария.

За 8 часов до теста и во время теста - запрещаются антациды, антагонисты рецепторов гистамина 2 (конкретно: Циметидин, Ранитидин, Ренни, Гастротус, Маалокс).